

Specie

Agastache pallida (Lindl.) Cory

FAMIGLIA

Lamiaceae.

Agastache Clayt. Ex Gronov. è un genere della famiglia delle Lamiaceae, che comprende 22 specie.

DESCRIZIONE BOTANICA

Pianta perenne, erbacea, diffusa.

Habitus: emicriptofita scaposa eretta perenne.

Fusto: quadrangolari, lunghi, di colore verde-grigio.

Foglie: di piccole dimensioni, lanceolate, con bordi dentati, picciolate e opposte, piccole, di colore verde-grigio.

Fiore: tubolari disposti a punte, con un'ampia varietà di colori della corolla: rosa carminio, rosa-viola, rosa-arancione.



INFORMAZIONI ETNOBOTANICHE

L'agastache è originaria del Nord America. Alcuni agastachi sono usati come fonte di olio essenziale, piante aromatiche e medicinali, piante per miele e soprattutto come pianta ornamentale per la sua fioritura spettacolare (Zielieńska e Matkowski, 2014).

COMMERCIALIZZAZIONE

Non presente nella tradizione culinaria europea.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEL FIORE

Gli agastachi hanno un gusto più o meno pronunciato di menta, anice, liquirizia e limone.

USI CULINARI CONSIGLIATI

Le foglie e i fiori sono commestibili, sia crudi che essiccati.


Specie

Agastache pallida (Lindl.) Cory

INFORMAZIONI GENERALI

Le agastache sono piante aromatiche poco esigenti, resistenti alla siccità e rustiche (-17 °C). Si adattano a tutti i tipi di terreno, purché ben drenati. Esposizione al sole.

Cultivars sperimentate: *A. pallida* "Tangerine Dream" (rosa/arancione).



PROTOCOLLO TECNICO

Nella regione mediterranea, zone riparate, a livello del mare.

Tecniche di moltiplicazione: talee in primavera/autunno.

Periodo di impianto: primavera/autunno.

Ambiente di coltivazione: in vaso sotto serra o in piena terra.

Densità di coltivazione: 1 pianta per vaso da 3 litri il primo anno, quindi in contenitori di maggior volume a seconda della crescita, 4 piante/m².

Manutenzione culturale: cimatura, taglio dei fiori appassiti, poco esigente in termini di concimazione e irrigazione, potatura in inverno.

Problemi fitosanitari possibili: afidi e cocciniglie.

Difesa (lotta biologica): predatori di afidi (*Aphidoletes* sp., *Scymnus* sp., *Syrphids*, *Chrysoperla carnea*) e parassitoidi (*Praon* sp.); predatori di cocciniglie (*Cryptolaemus montrouzierii*, *Rodolia cardinalis*) e parassitoidi (*Anagrus* spp.).



Specie

Agastache pallida (Lindl.) Cory

RACCOLTA

Produttività: 1112 fiori/m²/settimana per *A. pallida* "Tangerine Dream".

Tempo di raccolta: 3 e 30 min per raccogliere un piccolo vassoio (150 g) con circa 100 fiori.

Calendario di fioritura:









 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

POST RACCOLTA

Confezionamento: 60-70 fiori per vassoio piccolo (150 g).

Conservazione: 6 giorni a 5 °C.

Essiccazione: non testata.

Trasformazione: eccellente per aromatizzare sale e zucchero; sciroppo.

